



ZEHİRLENMELER



Mantar zehirlenmeleri
ölümcü olabilir

Düğün evinde
tüpten sızan gazdan
www.diyadinnet.com
ZEHİRLENDİLER



Zehirlenmelerde
ilk sırayı
"ilaçlar" alıyor



SOBA CAN ALDI 2 ÖLÜ



**KİMYASAL MADDEDEN
ZEHİRLENDİ**





ZEHİRLENME

Zehirlenme; Vücuda zehirli (toksik) maddenin girmesi sonucu normal vücut fonksiyonlarının bozulmasıdır.

Vücudun yaşamsal fonksiyonlarına zarar veren her türlü maddenin zehirli olduğu varsayılır.





ZEHİRLENME YOLLARI

- 1. Sindirim yolu ile zehirlenme;** kimyasal maddeler, bozuk besinler, zehirli mantarlar, ilaç, aşırı alkol vb.
- 2. Solunum yolu ile zehirlenme;** karbonmonoksit (tüp kaçakları, şofben, bütan gaz sobaları, vb.), lağım çukuru veya kayalarda biriken karbondioksit, klor, yapıştırıcılar, boyalar ve ev temizleme maddeleri vb.
- 3. Cilt yoluyla zehirlenme ;** böcek sokmaları, hayvan ısırmaları, saç boyaları, ilaç enjeksiyonu, zirai ilaçlar vb.



ZEHİRLENMELERDE GENEL BELİRTİLER

1. Sindirim sistemi :

Bulantı, kusma, gaz, şişkinlik, karın ağrısı, ishal

2. Sinir sistemi :

Bilinç kaybı, havale, hareketlerde uyumsuzluk, kasılma, şok

3. Solunum sistemi :

Nefes darlığı, solunum durması, baş ağrısı, baş dönmesi, ciltte kızarıklık, morarma

4. Dolaşım sistemi :

Nabız ritminde ve sayısında değişiklikler, baş ağrısı, soğuk terleme, kalp durması



SİNDİRİM YOLUYLA ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

- Hasta/yaralının bilinç ve yaşam bulguları kontrol edilir,
- Ağız zehirli maddeyle temas etmişse su ile çalkalanır,
- El ile temas etmişse el sabunlu su ile yıkanır,
- Kusma, bulantı, ishal vb. belirtiler değerlendirilir,



SİNDİRİM YOLUYLA ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

- Hasta/yaralı kusturulmaya çalışılmaz, özellikle yakıcı maddenin alındığı durumlarda kişi asla kusturulmaz,
- **Bilinç kaybı varsa; koma pozisyonu verilir,**
- Üstü örtülür.
- Tıbbi yardım için 112 aranır,
- Olayla ilgili bilgiler kaydedilir.
 - **Zehirli maddenin türü nedir?**
 - **Hasta/yaralı ilaç ya da uyuşturucu alıyor mu?**
 - **Hastanın bulunduğu saat ?**
 - **Evde ne tür ilaçlar var?**



SOLUNUM YOLU İLE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

- Hasta temiz havaya çıkarılır ya da cam, kapı vb. açılarak ortam havalandırılır,
- Hasta/yaralının bilinci ve yaşamsal bulgular değerlendirilir (ABC),
- Hasta/yaralıya **yarı oturur** pozisyon verilir,
- Bilinci kapalı ise; koma pozisyonu verilir.
- Tıbbi yardım için **112** aranır.



SOLUNUM YOLU İLE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

- İlk yardımcı uygulama sırasında kendini korumak için önlem almalıdır (maske ya da ıslak bez kullanılması),
- Olay yerinde elektrik düğmeleri ve diğer elektrikli aletler ile ışıklandırma cihazları kullanılmaz,
- Yoğun duman varsa hasta/yaralıyı dışarıya çıkarmak için ip kullanılır,
- İtfaiyeye haber verilir. **(110)**



CİLT YOLU İLE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

- Bilinç ve yaşam bulguları değerlendirilir.
- Ellerin zehirli madde ile teması önlenir,
- Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır,
- Zehirle temas etmiş vücut bölgesi **15 - 20 dakika süreyle bol suyla** yıkanır,
- Tıbbi yardım için **112** aranır.



ZEHİRLENMELERDE GENEL İLK YARDIM KURALLARI

- ❖ Zehirlenmeye neden olan maddeyi uzaklaştırmak,
- ❖ Zehirlenen kişinin yaşamsal fonksiyonlarının devamını sağlanmak,
- ❖ Tıbbi yardım istemek **(112)**



ŞOFBEN KAZALARI

Bu kazalar; yanma sırasında ortamdaki oksijenin tüketilmesi sonucu oluşmaktadır. **LPG zehirli değildir.**

Ancak; 6 m³'den küçük ve iyi havalandırılmamış mekanlarda **havadan ağır olması**, ortamdaki oksijen hızla tükenmekte ve kişiler bu yüzden havasızlıktan boğularak kaybedilmektedirler.





ŞOFBEN KAZALARINDA İLK YARDIM

- Kişi ortamdan uzaklaştırılır,
- Hareket ettirilmez,
- Yaşam bulguları değerlendirilir (ABC) ,
- Havayolu açıklığı sağlanır,
- Tıbbi yardım istenir. **(112)**



ŞOFBEN KAZALARINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Banyo içerden kilitlememeli,
- Şofben iyi çeken bir bacaya bağlanmalı,
- Şofbenin olduğu yere bol hava girişi sağlanmalı,
- Şofben ile tüp arasındaki hortum 125 cm'den uzun olmamalı,
- Banyodaki kişiler kontrol edilmeli.



KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Zehirlenme Belirtileri:

- Aşırı yorgunluk, huzursuzluk,
- Grip belirtileri,
- Bulantı, kusma, baş dönmesi, karıncalanma,
- Cilt ve tırnaklarda kısa süreli kiraz kırmızısı renk değişimi,
- Göğüs ağrısı, çarpıntı hissi, tansiyon düşüklüğü,
- Koma, solunum durması, kalp durması.



KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMELERİNDE İLK YARDIM

- Kişi ortamdan uzaklaştırılır,
- Hareket ettirilmez,
- Yaşam bulguları değerlendirilir (ABC),
- Hava yolu açıklığı sağlanır,
- Tıbbi yardım istenir. **(112)**



ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ 114

